

# Über optisch aktive Zwitterionen und Enolbetaine des Carvons

---

Verkürzte Fassung der  
INAUGURAL-DISSERTATION

zur Erlangung der philosophischen Doktorwürde, vorgelegt der  
philosophisch-naturwissenschaftlichen Fakultät  
der Universität Basel

von

HANS GYSIN  
aus Liestal

---

BASEL  
Buchdruckerei E. Birkhäuser & Cie., A. G.  
1939



Digitized by the Internet Archive  
in 2026

[https://archive.org/details/IA41546708\\_0033](https://archive.org/details/IA41546708_0033)

# Über optisch aktive Zwitterionen und Enolbetaine des Carvons

---

Verkürzte Fassung der

INAUGURAL-DISSERTATION

zur Erlangung der philosophischen Doktorwürde, vorgelegt der  
philosophisch-naturwissenschaftlichen Fakultät  
der Universität Basel

von

HANS GYSIN

aus Liestal

---

BASEL

Buchdruckerei E. Birkhäuser & Cie., A. G.

1939

Genehmigt von der philosophisch-naturwissenschaftlichen  
Fakultät auf Antrag der Herren Professoren Dr. H. Rupe  
und Dr. Fr. Fichter.

Basel, den 31. Mai 1938.

Prof. Dr. M. Reinhard  
Dekan.

Herrn *Hans Gysin* wurde von der philosophisch-natur-  
wissenschaftlichen Fakultät der Universität Basel am 31. Mai  
1938 erlaubt, diese verkürzte Fassung seiner Inaugural-Disser-  
tation drucken zu lassen. Die vollinhaltliche Arbeit mit dem  
Titel:

*Über optisch aktive Zwitterionen und Enolbetaine des Carbons*  
kann eingesehen oder entliehen werden:


1. im Chemischen Institut der Universität Basel;
2. in der Universitätsbibliothek Basel;
3. in der Schweizerischen Landesbibliothek in Bern.



## Über tertiäre Amino-alkohole und Enole aus Carvon.

Die vor einiger Zeit veröffentlichten Untersuchungen von *Rupe* und *Flatt*<sup>1)</sup> und *Rupe* und *Martin*<sup>2)</sup> über Betaine des Camphers regten uns zur Fortsetzung dieser Arbeiten an. Es sollte versucht werden, optisch aktive Betaine und Zwitterionen darzustellen mit Hydroxylgruppen, welche dem basischen Reste benachbart stehen, wenn möglich auch wahre Enolbetaine. Das Ausgangsmaterial bildete Carvonoxyd, das *Treibs*<sup>3)</sup> nach der schönen Methode von *Weitz*<sup>4)</sup> erhalten hatte, und dessen Darstellungsweise wir verbessern konnten.

Durch Umsetzung dieses Oxydes mit Dimethylamin konnten drei strukturisomere Basen, I, II, III, erhalten werden, deren Trennung zuerst durch Destillation im Hochvakuum, dann durch fraktionierte Krystallisation ihrer Perchlorate durchgeführt wurde.



<sup>1)</sup> Helv. **14**, 1007 (1931).

<sup>2)</sup> Helv. **17**, 1207 (1934).

<sup>3)</sup> B. **65**, 1319 (1932).

<sup>4)</sup> B. **54**, 2336 (1921).

Base I, das Hauptprodukt, gab ein Semicarbazon und ein Oxim; sie liess sich mit Nickelkatalysator<sup>1)</sup> in zwei Stufen hydrieren. Zuerst wurde die Isopropenyl-Doppelbindung reduziert, denn das neue Tetrahydro-carvonderivat Ia gab noch ein Semicarbazon. Dann folgte die viel langsamer verlaufende Hydrierung der Keto-gruppe zu einem 1-Methyl-4-isopropyl-1-dimethylamino-2,6-dihydroxy-cyclo-hexan, d. h. zu einem 1,3-Glykol V.

Den Beweis für diese Konstitutionsformel sehen wir besonders darin, dass bei der Oxydation dieses Glykols nach *Criegee* mit Bleitetraacetat verhältnismässig rasch 6 Atome Sauerstoff aufgenommen wurden, eine Art der Oxydation, die bei einem 1,2-Glykol nicht wahrscheinlich gewesen wäre. Auch andere, später zu erwähnende Reaktionen sprechen bestimmt für diese Formel. Base I wäre also 1-Methyl-1-dimethylamino-4-isopropenyl-cyclo-hexan-2-on-6-ol (2,6-Dihydro-oxy-1-dimethylamino-dihydro-carvon).

Die zweite Base (II), die weder ein Semicarbazon noch ein Oxim gibt, liess sich ebenfalls in zwei Stufen katalytisch hydrieren, aber die Wasserstoffaufnahme verlief hier viel langsamer als bei der ersten Base. Man erhält zuerst wie bei Base I ein Tetrahydro-oxy-carvon-Derivat IIa, das bei längerer Hydrierung durch Reduktion der Ketogruppe ein 1,2-Glykol liefert, VI. das

1-Methyl-4-isopropyl-6-dimethylamino-cyclo-hexan-1,2-diol.

Dieses nimmt mit Bleitetra-acetat genau ein Atom Sauerstoff auf, ein Verhalten, das beweisend ist für die Formel eines 1,2-Glykols. Die beiden unhydrierten Basen I und II geben mit Magnesiumhalogenalkylen tertiäre Alkohole.


Base I liefert bei der vollständigen Hydrierung zwei isomere Körper, Va und b, die sich allerdings nicht sehr voneinander unterscheiden. Wir halten sie für die beiden Diastereoisomeren, die beim Übergang der Ketogruppe in den sekundären Alkohol entstehen sollten. Die beiden Stereoisomeren unterscheiden sich dadurch, dass das eine ein Jodmethylat und ein Gold(III)-chlorid-komplexsalz gibt. Aber eine deutliche Differenzierung der beiden Körper zeigte sich erst in den aus ihnen dargestellten Betainbromhydraten (vgl. die folgende Abhandlung, dort die Formeln Va—b).

Es war zu erwarten, dass Base I leicht Wasser abspalten würde unter Bildung einer ungesättigten Verbindung. Dies war in der Tat der Fall, bei vorsichtigem Erhitzen der Base mit Zinkchlorid entsteht in guter Ausbeute eine neue Ketobase, IV, während Base II bei solchen Versuchen teils verharzte, teils unverändert wiedergewonnen wurde. Die neue ungesättigte Base gab nach

<sup>1)</sup> Gemeint ist unser Basler Katalysator.

*Zerewitinoff* ein positives Resultat, sie musste also noch eine Hydroxylgruppe enthalten. Das ist auch tatsächlich der Fall, und genaueres Studium der Base ergab, dass hier eine Enolverbindung entstanden war, VII.


Die Beweise dafür sind folgende: Der neue Körper zeigt keine Reaktion der Ketogruppe, enthält aber eine Hydroxylgruppe. Er gibt eine Acetylverbindung, einen Methyläther (Bestimmung nach *Zeisel*), der mit Methyl-magnesium-jodid nicht reagierte, und in wässriger-alkoholischer Lösung eine tiefblaurote Färbung mit Eisen(III)-chlorid. Würde sich diese Enolverbindung von der für die Base II angenommenen Formel ableiten, dann müsste daraus durch Kochen mit Mineralsäuren ein Benzolderivat entstehen<sup>1) 2)</sup>,



dies ist aber nicht der Fall, mit unserer Enolverbindung ist das nicht möglich, da sie sich von Formel I ableitet.

Dass Base I viel leichter und rascher hydriert wird als Base II, mag mit der Nachbarstellung der CO-Gruppe zur  $-\text{N} \begin{smallmatrix} \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \end{smallmatrix}$ -Gruppe zusammenhängen. Ganz Ähnliches wurde kürzlich von *Rupe* und *Tommasi*<sup>3)</sup> gefunden.

Neben Base I und II wurde bei der Einwirkung von Dimethylamin auf Carvonoxyd noch eine dritte Base (Base III) in sehr kleiner Menge gefunden (niedrigster Siedepunkt, sehr schön krystallisierendes Perchlorat), die ein Mol  $\text{H}_2\text{O}$  weniger enthielt als Base I und II. Sie gibt kein Semicarbazon, reagiert aber mit *Grignard*-Salzen unter Bildung eines tertiären Alkohols. Ihre Konstitution ist nicht ganz sicher; da sie keinen Hydroxylwasserstoff enthält (*Zerewitinoff*), muss eine reine Ketoform vorliegen. Von den beiden Formeln a und b ist a die wahrscheinlichere, denn b wäre die Ketoform der Enolbase IV, die als solche kaum existieren würde.



<sup>1)</sup> *Rupe* und *Emmerich*, B. **41**, 1393 (1908).

<sup>2)</sup> B. **39**, 1119 (1906); B. **38**, 1719 (1907); *Klages* und *Sommer*, B. **39**, 2306 (1906).

<sup>3)</sup> *Rupe* und *Tommasi*, Helv. **20**, 1089 (1937).

Der Körper ist ziemlich stark rechtsdrehend, er leitet sich vom Carvon-Typus ab als einzige aller dieser Basen, denn die andern alle sind linksdrehend, während Carvon selbst rechtsdrehend ist.

Sobald die 6,1-Doppelbindung des Carvons verschwindet durch Anlagerung von Sauerstoff oder basischen Resten, werden die Körper linksdrehend. Interessant ist auch das Resultat der krystallographischen Messungen der Perchlorate der Basen II und III (siehe unten), diese zeigen eine weitgehende Verwandtschaft. Das alles würde die Formel IIIa beweisen, die sich von der Base II ableitet, allerdings gelang eine Wasserabspaltung aus Base II nicht.

### Krystallographische Untersuchungen.

Die Substanzen I und II, d. h. ihre Perchlorate, scheinen auf den ersten Blick miteinander näher verwandt zu sein als II und III (I und II monoklin, III rhombisch). Diese Übereinstimmung ist jedoch nur eine scheinbare: I ist ausgeprägt monoklin; bei II zeigt sich sehr grosse Annäherung an rhombische, z. T. sogar noch an höhere (tetragonale) Symmetrien, durch welche sie der Substanz III viel eher gleicht. Die Abweichungen für II von der rhombischen Symmetrie sind nur äusserst geringe, wie dies besonders in der Flächenverteilung bei analoger Aufstellung von II und III zum Ausdruck kommt; ein Winkel  $\beta$  von fast  $90^\circ$  unterstreicht die Ähnlichkeit der beiden Körper. Die Unterschiede werden im wesentlichen durch die optischen Symmetrieverhältnisse bedingt. Während I keine Spaltbarkeit zeigt, so spalten II und III sehr gut.

Ausführliche Mitteilungen sind aus einer demnächst erscheinenden Abhandlung von den Herren Prof. Dr. M. Reinhard und Dr. O. Grütter ersichtlich, welche diese Untersuchung durchführten und denen wir dafür unseren besten Dank aussprechen.

### Experimenteller Teil.

(siehe Inauguraldissertation H. Gysin<sup>2)</sup>).

---

<sup>1)</sup> Bezogen in sehr reiner Form von Schimmel & Co. in Miltitz.

<sup>2)</sup> Dissertation über optisch aktive Zwitterionen und Enolbetaine des Carvons, Basel 1938, Chem. Anstalt und Universitätsbibliothek, oder Helv. Chimica Acta, Vol. XXI, 1416—1432.

## Über optisch aktive Zwitterionen und Enolbetaine.

Durch die in der vorhergehenden Arbeit beschriebenen hydroxylierten tertiären Basen waren wir in den Besitz einer grösseren Anzahl von Verbindungen gelangt, die sich gut für die Darstellung optisch aktiver Betaine eigneten. Es gelang auch, an fast alle Basen Bromessigester anzulagern, allerdings konnten nicht alle Bromhydrate in krystallisierter Form erhalten werden.

Einer der interessantesten Körper dieser Reihe ist das Betain-ester-bromhydrat aus Base I<sup>1</sup>), Formel I, denn seine wässrige Lösung zeigte beträchtlich Mutarotation. Die anfängliche Rechtsdrehung ging im Laufe einer Stunde auf die Hälfte zurück. Wurde aber das Bromhydrat unter vollkommener Abwesenheit von Wasser dargestellt und in Alkohol polarisiert, so beobachtete man eine konstante Linksdrehung, die mit umgekehrtem Vorzeichen nicht viel verschieden war von der in Wasser gefundenen (+ 7,8°, - 9,5°).

Die wässrige Lösung reagierte stark sauer auf Kongo, sie besass ein  $p_H$  von ungefähr 3. Die  $p_H$  wurden in verschiedenen Konzentrationen mit verschiedenen Elektroden genau gemessen. Wir erhielten Werte, die ungefähr einer Bromwasserstoffsäure von gleicher Konzentration (bis 0,1-n.) entsprachen. Die Bromhydrate der übrigen Betaine zeigten nur ganz schwach saure Reaktion,  $p_H$  6—4,5, mit einer Ausnahme: das Betain-bromhydrat der Enolbase VII reagiert auch stark sauer. Dafür war die linksdrehende alkoholische Lösung des Betain-bromhydrates von Base I nur schwach sauer.


Wird die Base I acetyliert und das Acetylderivat Ic mit Bromessigester behandelt, dann entsteht ein Ester-bromhydrat, das in Wasser  $p_H$  5 besitzt und keine Mutarotation zeigt. Wir sind der Ansicht, dass sich hier mit dem Bromhydrat folgendes begibt: In Wasser erfolgt unter Beteiligung der benachbarten Hydroxylgruppe in einigen Minuten eine vollkommene Abdissoziation von Bromwasserstoff, die Geschwindigkeit der Mutarotation ist ein Mass für den zeitlichen Verlauf dieser Reaktion; es bildet sich dabei ein neues, rechtsdrehendes Zwitterion<sup>2</sup>) von wahrscheinlich neutraler Reaktion, Ia.

Da nur noch das Bromhydrat des Enolbetains (Formel VII) eine analoge stark saure Reaktion zeigt, so wäre daran zu denken,

<sup>1</sup>) Die Numerierung der Formeln ist die gleiche wie in der vorhergehenden Arbeit.

<sup>2</sup>) Für das hypothetische Gebilde von der Formel Ia wollen wir die Bezeichnung „Zwitterion“ beibehalten.

dass die Abdissoziation des Bromwasserstoffs mit einem neu gebildeten Enolhydroxylwasserstoff erfolgt, Ib, doch spricht dagegen die schon erwähnte Tatsache, dass die Acetylverbindung Ic diese Erscheinung nicht zeigt.



Mit Silberoxyd gab das Bromhydrat I ein amorphes Betain von ganz neutraler Reaktion, aus dem ein schön krystallisierendes Perchlorat gewonnen werden konnte. Wir versuchten, das hypothetische Zwitterion Ia durch Umsetzung der wässrigen Lösung des Bromhydrates mit Magnesiumcarbonat zu erhalten, es entstand unter Kohlendioxyd-Entwicklung eine neutrale Lösung, aus der aber einzig mit Überchlorsäure das oben beschriebene Perchlorat vom Smp. 161° zu gewinnen war, nachdem beim Eindunsten der Lösung eine amorphe Masse sich gebildet hatte, die sich nicht umkrystallisieren liess und noch Spuren von Brom enthielt.

Die Base II reagiert viel langsamer mit Bromessigester als Base I, auch niemals vollständig. Das Salz Ib konnte aber krystallisiert erhalten werden, die wässrige Lösung zeigte  $p_H$  6. Das Salz verhielt sich also ganz normal und vollkommen verschieden vom Betain-ester der Base I. Das freie Betain der Base II, mit Thalliumhydroxyd dargestellt, hat  $p_H$  7.

Das Reduktionsprodukt der Base I, das 1,3-Glykol, Va und b, tritt (siehe vorhergehende Arbeit) in zwei diastereoisomeren Formen auf, beide geben krystallisierende Betain-ester-bromhydrate, die sich durch ihre Schmelzpunkte, besonders aber durch die spezifischen Drehungen stark unterscheiden ( $-10,3^\circ$  und  $+15,4^\circ$ ).







*Niels Bjerrum*<sup>1)</sup> hat in einer sehr bedeutenden Arbeit überzeugend dargetan, dass bei allen physiologisch wichtigen Aminosäuren der nicht ionisierte, d. h. nicht als Kation oder Anion vorhandene Teil, in der gleichzeitig positiv und negativ geladenen Form des Zwitterions vorhanden ist. Die Frage, ob eine Aminosäure als Zwitterion  $\text{H}_3\text{N}^+\text{CH}_2\text{COO}^-$  oder als echte Carbonsäure auftritt, hängt nach *Bjerrum* von der Stärke der Basen- und Säurendissoziationskonstante ab. Die aliphatischen Aminosäuren sind, da sie in undissoziiertem Zustand fast ausschliesslich aus Zwitterionen bestehen, als Ammoniumsalze ( $\text{H}_3\text{N}^+-\text{R}-\text{COO}^-$ ) aufzufassen<sup>2)</sup>).

### Optischer Teil.

In den vorliegenden Körpern hatten wir ein reiches Material zu optischen Untersuchungen, und wir machten bei den polarimetrischen Messungen einige zum Teil recht interessante Beobachtungen: Alle Körper, welche die Konfiguration des Carvonoxides beibehielten, blieben linksdrehend. Der Quotient der Rotationsdispersion hatte für die Base I und ihre Derivate fast genau den Wert des Carvons, nämlich  $F/C - 2,02$  (Carvon  $- 2,03$ ). Eine grössere Abweichung zeigte Base II und ihre Derivate, indem wir dafür einen Mittelwert von  $2,48$  für  $F/C$  fanden.  $1/\lambda$  als Funktion von  $\lambda^2$  ergab für beide Reihen, meist mit sehr guter Annäherung, Gerade und auch die Konstanten zeigten uns, dass eine durchaus normale Rotationsdispersion vorlag. Sehr interessant ist das optische Verhalten der Basen bei ihrer Überführung in die Perchlorate, indem dabei ihre Drehung stark abnimmt und beim Perchlorat der Base II sogar einen positiven Wert annimmt. Für Base III ist bezeichnend, dass sie als Carvonderivat, mit nur einem Asymmetriezentrum (dem ursprünglichen asymmetrischen C-Atom des Carvons) einen positiven Drehwert ergibt. Der Quotient von

$$\frac{[\alpha]_D}{[\alpha]_C} = 5.5$$

war hier ausserordentlich hoch;  $[1/\alpha]$  als Funktion von  $\lambda^2$  ergab ziemlich starke Abweichungen von einer Geraden, und trotzdem stimmten die Konstanten mit einem normal dispergierenden Körper gut überein. Für den tertiären Alkohol aus Base III fanden wir für

<sup>1)</sup> Z. physikal. Ch. **104**, 147—173 (1923).

<sup>2)</sup> Vgl. auch die interessanten Beiträge von *Richard Kuhn*, Forschungen und Fortschritte, 12. Jahrg. **1936**, 325.

<sup>3)</sup> Es sei hier auf die sehr bemerkenswerte Arbeit von *Kirpal* und *Wojnar* (B. **71**, 1261 (1938)) hingewiesen: Über Pyridiniumverbindungen und Betaine. Es wäre interessant gewesen, diese Versuche auch mit Halogenfettsäure-Estern auszuführen. Vgl. auch die sehr interessanten Mitteilungen von *R. Kuhn* und *Bär* (A. **516**, 155 (1935): Zwitterion aus Phtalon.

$F/C$  sogar einen Wert von 9,5 und auch hier haben wir es kaum mit einer Anomalie zu tun, da die errechneten Konstanten ( $\lambda_0^2$ ,  $\lambda_z$ , P. R. D.) keine Anomalie erkennen liessen. Dieser Befund zeigt, dass die Grösse des Dispersionsquotienten nach oben sehr weit ausgedehnt werden kann, ohne dass Anomalie der Rotationsdispersion eintritt, während sehr geringe Abweichungen unter 1,8 stets eine Anomalie bedeuten.

Bei der Überführung vom 3- in den 5-wertigen, bzw. beim Übergang zum koordinativ gesättigten Stickstoff, zeigt sich beim Perchlorat von III eine vollständige Umkehr der Drehung, keine Abnahme wie dies bei I und II beobachtet wurde, und ein ganz normales  $F/C$  von 2,24. Die Enolbase zeigte ganz normale Rotationsdispersion und einen Wert von 2,37 für  $F/C$ .

Von ganz besonderem Interesse waren für uns die Ergebnisse der polarimetrischen Messungen der Betaine und ihrer Esterbromhydrate. Allgemein ist festzustellen, dass wir es durchwegs mit relativ kleinen Drehungen zu tun hatten. Die Bromessigesterderivate der Hauptbasen I, II und III lenkten das polarisierte Licht im gleichen Sinne ab, wie die Perchlorate der entsprechenden Basen. Das Bromhydrat der Enolbase hatte praktisch keine Drehung; ob es sich um eine Racemisierung oder um eine zufällige Kompensation der Wirkungen auf die beiden Asymmetriezentren handelt, wagen wir nicht zu entscheiden.

Im Betainbromhydrat der Base I hatten wir einen Körper, der aus Wasser aufgearbeitet und in Wasser polarisiert eine starke Mutorotation und Rechtsdrehung zeigte ( $+7,8^\circ + 3,1^\circ$ ), während die aus Äther aufgearbeitete Substanz, die nie mit Wasser in Berührung kam, nicht umkrystallisiert den höchsten Wert und zwar  $[\alpha]_D = 9,56^\circ$  (in Alkohol polarisiert) und  $[\alpha]_D = 7,1^\circ$  (in Wasser polarisiert) zeigte. Ein aus Alkohol umkrystallisiertes Produkt zeigte eine Drehung von  $[\alpha]_D = 5,3^\circ$ . Wie im theoretischen Teil erörtert, dürfte diese Mutorotation mit einer Umwandlung in der Konstitution des Körpers zusammenhängen<sup>1)</sup>.

Die Drehungen der Betaine der Basen I und II waren beide negativ, also hatte sich für II das Vorzeichen geändert, ein Befund, der sich auch beim Übergang von dem Bromhydrat des Acetylderivates von I in das betreffende Betain zeigte. Dieser Wechsel des Vorzeichens ist bemerkenswert, denn weder *Flatt* noch *Martin* fanden bei ihren Betainen ein derartiges Resultat. In dem dort (*Rupe* und *Martin*) angegebenen Sinn verlief der Übergang von Betainbromhydrat VI zum Betain, indem dieses Zwitterion im gleichen Sinn und weit stärker drehte als sein zugehöriges Bromhydrat.

<sup>1)</sup> *Kuhn* und *Birkofer* (B. **71**, 1535 (1938)) brachten kürzlich eine wertvolle Theorie der Mutorotation, beruhend auf der Ringdoppelbindungs-Desmotropie. Als ungesättigte Form käme in unserem Falle vielleicht das Zwitterion Formel Ia in Betracht.

| Substanz                       | Lösungs-<br>mittel | $[\alpha]_{H_C}$                        | $[\alpha]_{K_n}$ | $[\alpha]_D$     | $[\alpha]_{H_g}$ | $[\alpha]_{K_n}$ | $[\alpha]_{H_F}$        |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Base I . . . . .               | in Substanz        | -42,73                                  | -49,50           | -55,16           | -66,66           | -78,84           | -90,34                  |
| Base I Perchlorat . . . . .    | Wasser 1,25%       | -9,99                                   | -11,18           | -12,78           | -14,78           | -16,78           | -21,17                  |
| Betain von Base I . . . . .    | Wasser 10%         | -8,6                                    | —                | -12,0            | -14,7            | —                | -21,6                   |
| Base II . . . . .              | in Substanz        | -29,69                                  | -35,37           | -40,85           | -53,65           | -68,76           | -83,73                  |
| Base II Perchlorat . . . . .   | Wasser 10%         | +6,54                                   | +8,40            | +9,86            | +13,38           | +18,36           | +23,34                  |
| Betain von Base II . . . . .   | Wasser 5%          | -8,6                                    | —                | -11,8            | -13,0            | —                | -16,1                   |
| Base III . . . . .             | in Substanz        | +19,68                                  | +25,40           | +30,77           | +44,94           | +66,39           | +101,04                 |
| Base III Perchlorat . . . . .  | Wasser 5%          | -30,2                                   | -34,9            | -40,1            | -48,4            | -58,7            | -67,5                   |
| Tertiärer Alkohol aus Base III | Benzol 10%         | -1,24                                   | —                | -3,16            | -4,52            | —                | -11,86                  |
| Enolbase . . . . .             | in Substanz        | -8,19                                   | -9,58            | -10,81           | -13,44           | -16,48           | -19,36                  |
| Substanz                       | Lösungs-<br>mittel | $\frac{[\alpha]_{H_F}}{[\alpha]_{H_C}}$ | $\lambda_0^2$    | $\lambda_\alpha$ | P. R. D.         | K <sub>0</sub>   | Berechnet               |
| Base I . . . . .               | in Substanz        | 2,11                                    | 0,06419          | 625,77           | 158,55           | 15,588           | 66,62 $[\alpha]_{H_g}$  |
| Base I Perchlorat . . . . .    | Wasser 1,25%       | 2,12                                    | —                | —                | —                | —                | —                       |
| Betain von Base I . . . . .    | Wasser 10%         | 2,50                                    | 0,1029           | 569,3            | 182,64           | 2,8757           | -21,56 $[\alpha]_{H_F}$ |
| Base II . . . . .              | in Substanz        | 2,83                                    | 0,13148          | 524,79           | 196,84           | 8,8308           | 84,26 $[\alpha]_{H_F}$  |
| Base II Perchlorat . . . . .   | Wasser 10%         | 2,78                                    | —                | —                | —                | —                | —                       |
| Betain von Base II . . . . .   | Wasser 5%          | 1,87                                    | 0,01393          | 724,68           | —                | 4,0431           | -16,15 $[\alpha]_{H_F}$ |
| Base III . . . . .             | in Substanz        | 5,13                                    | 0,18916          | 498,4            | 216,77           | 4,8205           | 19,91 $[\alpha]_{H_C}$  |
| Base III Perchlorat . . . . .  | Wasser 5%          | 2,24                                    | —                | —                | —                | —                | —                       |
| Tertiärer Alkohol aus Base III | Benzol 10%         | 9,55                                    | 0,2103           | 493,25           | 226,18           | 0,353            | -1,60 $[\alpha]_{H_C}$  |
| Enolbase . . . . .             | in Substanz        | 2,37                                    | 0,09312          | 489,9            | 149,49           | 2,7579           | -13,57 $[\alpha]_{H_F}$ |
|                                |                    |                                         |                  |                  |                  |                  | -19,26 $[\alpha]_{H_F}$ |

Da nicht alle Betaine, bzw. ihre Salze krystallisiert erhalten werden konnten, so sind die gefundenen Drehwerte auch nur in den Fällen absolut zuverlässig, wo Umkrystallisation möglich war, und man muss daher bei den nicht vollständig rein zu erhaltenen Substanzen mit weiteren Schlüssen sehr zurückhaltend sein.

### Experimenteller Teil.

Betain-ester-bromhydrat der Base I (Formel I).

5 g durch Destillation im Hochvakuum gereinigte Base I werden mit 5 g Bromessigester vermischt. Es entsteht eine klare Lösung, die sich nach einigen Minuten trübt und nach dem Stehen über Nacht zu einer harten Kruste erstarrt. Die Aufarbeitung kann nach zwei verschiedenen Arten geschehen.

1) Man gibt zum Reaktionsprodukt soviel Wasser, bis der ganze feste Anteil gelöst ist, trennt ab vom überschüssigen Bromessigester und extrahiert so lange mit Äther, bis der Bromessigester ganz entfernt ist. Die farblose wässrige Lösung wird im Vakuumexsikkator bei 30—40° bis zur Trockene eingedunstet. Man erhält eine leicht gelbe, kolophonumartige Masse, die nochmals in Wasser aufgenommen und mit Norit-Kohle einige Stunden geschüttelt wird. Aus dem Filtrat erhält man dann beim Eindunsten im Vakuum eine farblose, durchsichtige glasige Substanz, Ausbeute 7,4 g. Der Körper lässt sich aus einer Mischung von Alkohol und Essigester umkrystallisieren, doch sind dabei immer beträchtliche Anteile nicht mehr krystallin zu erhalten, die aber zur Verwandlung in die freie Betainbase benützt werden können. Das krystallisierte Bromhydrat schmilzt unter teilweiser Zersetzung bei 165°.

2) Das erstarrte Reaktionsprodukt aus Base und Bromessigester wird mit Äther verrieben, wobei es sich allmählich in ein weisses feinkrystallines Pulver verwandelt. Es wird dann auf eine Glasnutsche gebracht und unter Feuchtigkeitsabschluss mit Äther so lange ausgewaschen, bis aller Bromessigester entfernt ist. Das auf diese Weise gewonnene Präparat zeigte in absolutem Alkohol die höchste optische Drehung von  $[\alpha]_D = -9,56^\circ$ . Krystallisiert man das Salz aus Alkohol um, so erhält man schon eine kleinere Drehung. Für Analyse und Polarisation wurde deswegen immer die nach dem zweiten Verfahren gewonnene Substanz benützt.

3,602; 4,058 mg Subst. gaben 6,695; 7,580 mg CO<sub>2</sub> und 2,320; 2,670 mg H<sub>2</sub>O  
8,673; 6,700; 8,548 mg Subst. gaben 0,305; 0,242; 0,308 cm<sup>3</sup> N<sub>2</sub> (18,5°, 749 mm):  
21,5°, 738 mm; 20°, 738,5 mm)

|                                                    |              |              |                     |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| C <sub>16</sub> H <sub>28</sub> O <sub>4</sub> NBr | Ber. C 50,77 | H 7,46       | N 3,71%             |
| Gef. „                                             | 50,71; 50,94 | „ 7,20; 7,36 | „ 4,05; 4,08; 4,08% |

Perchlorat. Gibt man zu einer konzentrierten Lösung des Bromhydrates in Wasser 60-proz. Überchlorsäure, so erhält man beim Reiben mit dem Glasstab ein kry-

stallines Salz. Nach dem Umkrystallisieren aus einer Mischung von Alkohol und Äther bildet es feine weisse Nadeln vom Smp. 159°, doch fängt es schon bei 152° an zu sintern.

7,545 mg Subst. gaben 0,228 cm<sup>3</sup> N<sub>2</sub> (19°, 750 mm)

C<sub>16</sub>H<sub>28</sub>O<sub>8</sub>NCl Ber. N 3,52 Gef. N 3,49%

Wie in der Einleitung hervorgehoben wurde, zeigt dieses Bromhydrat ein sehr interessantes Verhalten in wässriger Lösung, in der es sehr stark sauer reagiert, so dass wir eine Dissoziation zu einer neuen Base und Bromwasserstoff angenommen haben. Aus diesen Gründen wurde das p<sub>H</sub> verdünnter Lösungen des Salzes gemessen<sup>1)</sup>.

Aus 0,2036 g Substanz wurden 53,84 cm<sup>3</sup> einer wässrigen, genau 0,01-n. Lösung dargestellt. Die abgelesenen p<sub>H</sub>-Werte an der Wasserstoff-, an der Chinhydronelektrode und an der Glas-elektrode waren folgende:

| H-elektrode                            | Chinhydronelektrode | Glaselektrode |
|----------------------------------------|---------------------|---------------|
| 0,01-n. 0,65; 0,70; 0,61 <sup>2)</sup> | 2,35; 2,33; 2,31    | 2,35          |
| 0,001-n. 3,13; 3,12; 3,12              | 3,02; 3,02          | 3,05          |
| 3,01; 3,03; 3,05                       |                     |               |

Hier seien noch die polarimetrischen Messungen der Lösungen des Bromhydrates des Betains von Base I gebracht, alle in 10-proz. Lösung:

|                        | Lösung  | d <sub>4</sub> <sup>20</sup> | [α] <sub>D</sub> |                         |
|------------------------|---------|------------------------------|------------------|-------------------------|
| Dargestellt mit Wasser | Wasser  | 1,0281                       | + 7,80°          | 1 dm-Rohr. Mutarotation |
| „ ohne Wasser          | Alkohol | 0,8108                       | - 9,56°          | Drehung konstant        |




Fig. 1.

Mutarotation: Betain-bromhydrat von Base I  
(aus Wasser aufgearbeitet).

Betain. 5 g des Bromhydrates wurden in Wasser mit einem Überschuss von frischgefälltem Silberoxyd einige Minuten geschüttelt, bis in einer Probe kein Halogen mehr nachgewiesen werden

<sup>1)</sup> Diese Messungen wurden unter liebenswürdiger Mithilfe der HH. Prof. Fr. Bürki und cand. phil. Ostwald ausgeführt; wir danken diesen Herren bestens für ihre Mühe und für die gütige Überlassung der Apparaturen.

<sup>2)</sup> Bei dieser Konzentration wird die Wasserstoffelektrode sofort vergiftet.

konnte. War das der Fall, so wurde die rasch filtrierte Lösung im Vakuum bei 30—40° eingedunstet; dabei schied sich noch Silber ab, so dass nochmals filtriert und die Lösung mit Tierkohle geschüttelt wurde. Aus dem Filtrat konnte dann das Betain in Form einer farblosen glasigen Masse gewonnen werden, die sehr hygroskopisch war und leichtlöslich in Alkohol und Essigester; die wässrige Lösung reagierte auf Lackmus vollkommen neutral.

Polarisation in Wasser:

$$p = 10 \quad d_4^{20} = 1,0208 \quad \alpha_D^{20} = 1,22^\circ \text{ (Dezimeterrohr)} \quad [\alpha]_D = -12,0^\circ \quad M_D = -32,3^\circ$$

Zur Analyse wurde das charakteristische Perchlorat benützt, welches aus dem Betain durch Anreiben zuerst mit 20-proz. und dann mit 60-proz. Überchlorsäure sich krystallin ausscheidet. Nach 3-maligem Umkrystallisieren aus absolutem Alkohol zeigt es den Smp. 162°, sintert bei 157°,  $p_H = 5$ .

5,976 mg Subst. gaben 0,219 cm<sup>3</sup> N<sub>2</sub> (19°, 725 mm)

C<sub>14</sub>H<sub>23</sub>O<sub>8</sub>NCl      Ber. N 3,79      Gef. N 4,09%

Verwendet man an Stelle von Silberoxyd Silbercarbonat, so verläuft die Umsetzung zur Betainbase genau so wie oben beschrieben. Günstig erwies sich die Anwendung von Thalliumcarbonat, das so gewonnene Betain lieferte das Perchlorat vom Smp. 158—160°. Weitere Versuche wurden unter Anwendung von festem Magnesiumcarbonat ausgeführt, weil damit eine Verseifung der Carboxylgruppe kaum zu befürchten war. Beim Erwärmen der wässrigen Lösung mit diesem Carbonat setzt eine lebhafte Kohlendioxydentwicklung ein und die Reaktion der Lösung wird nach einiger Zeit vollständig neutral oder etwas schwach alkalisch. Aus dem Filtrat wird mit Überchlorsäure das Perchlorat vom Smp. 161° erhalten, das bei 157° zu sintern anfängt (s. o.). Mit dem wasserfrei dargestellten Bromhydrat verläuft die Reaktion mit Magnesiumcarbonat natürlich ebenso, es gelang aber nicht, ein krystallines analysierbares Reaktionsprodukt zu gewinnen (neues neutrales Zwitterion, siehe Einleitung).

Dafür erhielten wir auch daraus dasselbe Betain-perchlorat vom Smp. 158—160°.

6,135 mg Subst. gaben 2,310 mg AgCl

C<sub>14</sub>H<sub>23</sub>O<sub>8</sub>NCl      Ber. Cl 9,59      Gef. Cl 9,31%

Andere Carbonate, wie Bleicarbonat, gaben kein besseres Resultat. Versetzt man die wässrige Lösung des Bromhydrates mit Natriumacetat, so lässt sich sofort freie Essigsäure nachweisen, und die Reaktion auf Kongopapier verschwindet. Die durch Einwirkung von Magnesiumcarbonat nach dem Eintrocknen im Vakuumexsikkator bei 40° gewonnene Masse versuchten wir, da sie nur in Wasser und Alkohol löslich war (worin aber auch Magnesiumbromid sich löst), durch Auskochen mit reinem Dioxan in reiner Form zu erhalten. Das gelang aber nicht nach Wunsch, denn nach dem Abdestillieren des Lösungsmittels wurde eine kleine Menge einer braungefärbten hygroskopischen Substanz gewonnen, die aber noch etwas bromhaltig war.

# Betain-ester-bromhydrat der Base II (Formel IIb).

Die Base II reagiert nur sehr langsam und unvollkommen mit Bromessigester, nach 1-monatlichem Stehen beträgt die Ausbeute an Betainsalz erst 30 %. Durch Erwärmen auf dem Wasserbade kann die Addition beschleunigt werden. Man nimmt das Reaktionsprodukt in Wasser auf, äthert mehrfach aus und dunstet im Vakuum bei 30—40° ein. Man erhält so 53 % einer gelben kolophoniumartigen Masse, die sich aber durch Auflösen in Alkohol und Ausfällen mit Äther in krystalliner Form erhalten lässt, Smp. 166°, allerdings, wie Analyse zeigt, nicht vollkommen rein.

4,282; 4,690 mg Subst. gaben 7,716; 8,469 mg CO<sub>2</sub> und 2,683; 3,135 mg H<sub>2</sub>O

|                                                    |                     |               |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| C <sub>16</sub> H <sub>28</sub> O <sub>4</sub> NBr | Ber. C 50,77        | H 7,46%       |
|                                                    | Gef. „ 49,15; 49,25 | „ 7,01; 7,48% |

Polarisation in Wasser:

p = 10    d<sub>4</sub><sup>20</sup> = 1,0250    α<sub>D</sub><sup>20</sup> = 0,30° (Dezimeterrohr)    [α]<sub>D</sub> = 5,86°    M<sub>D</sub> = 22,2°

Im Gegensatz zu der wässrigen Lösung des Betain-bromhydrates der Base I, das sehr stark sauer reagiert, besitzt dieses Salz ein p<sub>H</sub> von ungefähr 6.

Betain. Die Darstellung dieses Körpers aus dem Bromhydrat erwies sich als sehr verlustreich. Bei der Anwendung von Silberoxyd trat weitgehende Zersetzung ein unter Bildung von kleinen Öltropfen, und nur ein kleiner Teil blieb wasserlöslich und konnte durch Eindunsten gewonnen werden. Wenig bessere Resultate lieferte die Verwendung von Thallohydroxyd. Beim Schütteln des Bromides mit diesem Hydroxyd und nach dem Abfiltrieren des Thalliumbromides wurde aus der klaren Lösung das überschüssige Thalliumion mit Schwefelwasserstoff ausgefällt. Doch auch hier trat beim vorsichtigen Eindunsten des Filtrates weitgehende Zersetzung ein, so dass das gewünschte Betain nur in kleiner Menge erhalten wurde. Es verhält sich gegen Lackmus ganz neutral und mit dem Universalindikator wurde das p<sub>H</sub> bei 7 gefunden<sup>1)</sup>.

p = 5    d<sub>4</sub><sup>20</sup> = 1,0154    α<sub>D</sub><sup>20</sup> = -0,30° (0,5 dm-Rohr)    [α]<sub>D</sub> = -11,8°    M<sub>D</sub> = -31,8°

Es gelang leider nicht, ein wohldefiniertes Perchlorat darzustellen. Es liess sich weder aus Wasser noch aus einem organischen Lösungsmittel umkrystallisieren.

Betain-ester-bromhydrate der beiden Basen Va und Vb.

a) In der vorhergehenden Abhandlung wurde mitgeteilt, dass die Base V, das Hydrierungsprodukt der Base I, in zwei diastereoisomeren Formen auftritt. Beide Isomere wurden nun in die Betain-bromhydrate verwandelt. Das dünnflüssige Isomere Va ver-

<sup>1)</sup> Universalindikator von F. R. McCrumb, C. 1931, II, 3019. Auch unter Verwendung anderer Indikatorlösungen erhielten wir p<sub>H</sub>-Werte von derselben Grösse.

einigte sich sehr rasch mit Bromessigester, und in kurzer Zeit erhielt man das Bromid als weisse, feinkrystalline Masse. Nach 12-stündigem Stehen wurde mit absolutem Äther so lange verrieben, bis alles fest und trocken war, dann wurde auf der Nutsche unter Feuchtigkeitsabschluss mit Äther gründlich ausgewaschen. Das Salz konnte aus absolutem Alkohol-Essigester umkrystallisiert werden; weisse Krystalle, Smp. 218—220°.

b) 1 g der Base Vb (das zweite, viskose, Stereoisomere) wurde mit 1 g Bromessigester durch Rühren zu einer homogenen Mischung gebracht. Nach 1 Stunde fängt das neue Salz an auszukrystallisieren. Nach dem Stehen über Nacht wurde wie oben für Va beschrieben aufgearbeitet. Der Schmelzpunkt des aus Alkohol umkrystallisierten Körpers liegt bei 201°, ein Mischschmelzpunkt mit dem Bromhydrat Va lag bei 205°.

3,765; 3,180 (Va); 3,177 (Vb) mg Subst. gaben 6,935; 5,850; 5,840 mg CO<sub>2</sub> und 2,755; 2,290; 2,270 mg H<sub>2</sub>O  
 9,313; 8,710 mg Subst. (Va) gaben 0,322; 0,306 cm<sup>3</sup> N<sub>2</sub> (18°, 736 mm; 21,5°, 736 mm)  
 C<sub>16</sub>H<sub>32</sub>O<sub>4</sub>NBr Ber. C 50,25 H 8,25 N 3,67%  
 Gef. „ 50,23; 50,17; 50,13 „ 8,19; 8,06; 7,99 „ 3,93; 3,87%

Polarisation der Betainbromhydrate in Wasser:

Va: p = 5 d<sub>4</sub><sup>20</sup> = 1,0129 α<sub>D</sub><sup>20</sup> = -0,26° (0,5 dm-Rohr) [α]<sub>D</sub> = -10,3° M<sub>D</sub> = -39,4°  
 Vb: p = 10 d<sub>4</sub><sup>20</sup> = 1,0260 α<sub>D</sub><sup>20</sup> = 0,80° (1 dm-Rohr) [α]<sub>D</sub> = 15,4° M<sub>D</sub> = 58,9°

Perchlorat von Va. Es wird erhalten durch vorsichtigen Zusatz von 60-proz. Perchlorsäure zu einer wässrigen Lösung des Bromhydrates. Nach dem Umkrystallisieren aus Alkohol bildet der Körper weisse perlmutterglänzende Blättchen vom Smp. 196—199°.

7,661 mg Subst. gaben 0,244 cm<sup>3</sup> N<sub>2</sub> (17,5°, 747 mm)  
 C<sub>16</sub>H<sub>32</sub>O<sub>8</sub>NCl Ber. N 3,49 Gef. N 3,68%

Das Betain wurde in üblicher Weise mit Silberoxyd dargestellt. Man erhielt eine kolophoniumartige, etwas gelbe, sehr hygroskopische Substanz, die nicht umkrystallisiert werden konnte; ihr p<sub>H</sub> in wässriger Lösung liegt bei 7.

Polarisation in Wasser:

p = 5 d<sub>4</sub><sup>20</sup> = 1,0076 α<sub>D</sub><sup>20</sup> = 0,19° (0,5 dm-Rohr) [α]<sub>D</sub> = 7,5°

Perchlorat. Es ist schwer löslich und kann aus Alkohol umkrystallisiert werden; Smp. 201°, sintert bei 194°.

5,596 mg Subst. gaben 6,690 cm<sup>3</sup> N<sub>2</sub> (17,5°, 737 mm)  
 C<sub>14</sub>H<sub>28</sub>O<sub>8</sub>NCl Ber. N 3,75 Gef. N 3,68%

Betain-bromhydrat von Base VI. (1,2-Glykol).

Lässt man 2 g der Base VI mit 4 g Bromessigester 8 Tage in der Kälte stehen, so erhält man auf Zusatz von Äther ein weisses, festes Salz in einer Ausbeute von 2,5 g. Etwas schneller kommt man zum Ziel durch Erwärmen auf dem Wasserbade, das Produkt ist aber weniger rein. Nach dem Umkrystallisieren aus Alkohol

schmilzt es bei 187°, durch Verdunsten einer wässrigen Lösung kann man schöne prismatische Krystalle erhalten.  $p_H$  der wässrigen Lösung bei ca. 5.

7,425 mg Subst. gaben 0,249 cm<sup>3</sup> N<sub>2</sub> (17°, 750 mm)

C<sub>16</sub>H<sub>32</sub>O<sub>4</sub>NBr Ber. N 3,67 Gef. N 3,89%

Polarisation in Wasser:

$p = 10$   $d_4^{20} = 1,0260$   $\alpha_D^{20} = -0,86^\circ$  (Dezimeterrohr)  $[\alpha]_D = -8,38^\circ$   $M_D = -32,0^\circ$

Perchlorat. Ziemlich schwer löslich in Wasser, aus Alkohol und Äther umkrystallisiert, feine Nadeln, Smp. 233°.

3,810; 3,332 mg Subst. gaben 6,690; 5,825 mg CO<sub>2</sub> und 2,645; 2,305 mg H<sub>2</sub>O

6,917 mg Subst. gaben 0,220 cm<sup>3</sup> N<sub>2</sub> (19,5°, 746 mm)

C<sub>16</sub>H<sub>32</sub>O<sub>8</sub>NCl Ber. C 47,80 H 7,85 N 3,49%

Gef. „ 47,89; 47,68 „ 7,78; 7,73 „ 3,64%

Betain. Es wurde mit Silberoxyd dargestellt und bildete zunächst eine gelbliche Kruste, welche durch Lösen in Alkohol und Zusatz von Äther krystallin erhalten werden konnte. Weisses Krystallpulver, Smp. 168—169°. Die wässrige Lösung reagiert gegen Lackmus neutral.

3,482 mg Subst. gaben 7,815 mg CO<sub>2</sub> und 3,105 mg H<sub>2</sub>O

4,100 mg Subst. gaben 0,178 cm<sup>3</sup> N<sub>2</sub> (17,5°, 739 mm)

C<sub>14</sub>H<sub>27</sub>O<sub>4</sub>N Ber. C 61,49 H 9,96 N 5,13%

Gef. „ 61,21 „ 9,97 „ 4,96%

Polarisation in Wasser:

$p = 10$   $d_4^{20} = 1,0168$   $\alpha_D^{20} = -1,49^\circ$  (0,5 dm-Rohr)  $[\alpha]_D = -29,3^\circ$   $M_D = -80,1^\circ$

Perchlorat ist ziemlich schwer löslich, kann aus Alkohol und Äther umkrystallisiert werden, feine weisse Nadeln, Smp. 245°.

8,354 mg Subst. gaben 0,295 cm<sup>3</sup> N<sub>2</sub> (22°, 738 mm)

C<sub>14</sub>H<sub>28</sub>O<sub>8</sub>NCl Ber. N 3,75 Gef. N 3,96%

Anlagerung von Bromessigester an das Acetylderivat der Base I (Formel Ic). 4 g der acetylierten Base I (siehe die vorhergehende Abhandlung) lässt man über Nacht mit Bromessigester stehen. Auf Zusatz von Äther wird die Masse zuerst zähflüssig, um beim Reiben allmählich fest zu werden. Nach dem Auswaschen mit trockenem Äther wird die Substanz in einer Mischung von Essigester und Alkohol gelöst und mit absolutem Äther vorsichtig ausgefällt, kleine weisse Krystalle, Smp. 129—131°.

3,157 mg Subst. gaben 5,953 mg CO<sub>2</sub> und 1,975 mg H<sub>2</sub>O

C<sub>18</sub>H<sub>30</sub>O<sub>5</sub>NBr Ber. C 51,41 H 7,20%

Gef. „ 51,43 „ 7,00%

Polarisation A. in Alkohol:

$p = 9,77$   $d_4^{20} = 0,8254$   $\alpha_D^{20} = +0,57^\circ$  (0,5 dm-Rohr)  $[\alpha]_D = +13,81^\circ$   $M_D = 58,3^\circ$

Polarisation B. in Wasser:

$p = 10$   $d_4^{20} = 1,0221$   $\alpha_D^{20} = +0,88^\circ$  (0,5 dm-Rohr)  $[\alpha]_D = +16,24^\circ$   $M_D = 68,5^\circ$

Betain. Die Substanz wurde mit Silberoxyd dargestellt; farbloser glasiger Körper, sehr hygroskopisch. Es gelang nicht, ihn umkrystallisieren.

Perchlorat. Das Perchlorat krystallisiert beim Zusatz von Überehlersäure zur wässrigen Lösung rasch aus. Aus Alkohol und Äther umkrystallisiert, weisses, fein krystallines Produkt, sintert bei 115°, schmilzt unter Zersetzung bei 125°.

9,215; 7,868 mg Subst. gaben 0,302; 0,263 cm<sup>3</sup> N<sub>2</sub> (17,5°, 748 mm; 16°, 741 mm)  
 $C_{16}H_{26}O_9NCl$  Ber. N 3,40 Gef. N 3,79; 3,85%

Die Analyse gibt zu hohe Werte für Stickstoff, da das Acetylderivat teilweise verseift wurde, so dass das Betain-perchlorat der Base I sich bildete. Es lag also wahrscheinlich ein teilweise schon verseiftes Produkt vor.

Polarisation des Betains in Wasser:

$$p = 10 \quad d_4^{20} = 1,0198 \quad \alpha_D^{20} = -0,17^\circ \text{ (Dezimeterrohr)} \quad [\alpha]_D = -1,7^\circ$$

### Ester-bromhydrat des Enolbetains (Formel VII).

3 g der Base IV resp. VII (siehe die vorhergehende Abhandlung), aus Base I durch Wasserabspaltung dargestellt, liess man mit 3 g Bromessigester einige Tage stehen, wobei teilweise Krystallisation eintrat. Auf Zusatz von Äther wurde alles fest. Es wurde so lange mit Äther ausgewaschen bis der Bromessigester ganz entfernt war. Die Substanz muss sehr rasch umkrystallisiert werden, da sie sich sonst bald dunkelrot färbt und völlig verschmiert, deshalb wird in kaltem Alkohol gelöst und vorsichtig unter Reiben mit Äther versetzt. Der ganz reine Körper krystallisiert in feinen weissen Blättchen vom Smp. 129°. Die wässrige Lösung reagiert stark sauer,  $p_H = 3-4$ . Kongopapier wird nur schwach gebläut, während Methylorange rot wird.

5,951 mg Subst. gaben 0,220 cm<sup>3</sup> N<sub>2</sub> (21°, 738 mm)  
 $C_{16}H_{26}O_3NBr$  Ber. N 3,89 Gef. N 4,21%

Das Bromhydrat ist optisch inaktiv. Das Perchlorat ist schwer in reinem Zustande zu erhalten, es krystallisiert in farblosen Blättchen vom Smp. 238—239°.

Betain (Enolbetain) (Formel VIIa). Zur Entfernung des Broms wird am besten Thalliumhydroxyd verwendet an Stelle von Silberoxyd. Der Überschuss von Thalliumion wird mit Schwefelwasserstoff ausgefällt. Aus der filtrierten Lösung scheidet sich das Betain in schwach rosa gefärbten Krusten aus. Man kann aus Alkohol umkrystallisieren und aus den Mutterlaugen die Reste durch Zusatz von Äther ausfällen. Das Betain ist ein weisses Krystallpulver. Nach einmaligem Umkrystallisieren hat seine Löslichkeit in Wasser und in Alkohol so stark abgenommen, dass sich bei Zimmertemperatur nur noch 2,5 % des Salzes in Wasser lösen. Smp. 199—200°.  $p_H = 6$ .

4,270 mg Subst. gaben 10,455 mg CO<sub>2</sub> und 3,200 mg H<sub>2</sub>O  
 $C_{14}H_{21}O_3N$  Ber. C 66,89 H 8,43%  
 Gef. „ 66,78 „ 8,39%

### Das Salz zeigt keine optische Drehung.

Perchlorat. Das Perchlorat ist ziemlich schwer löslich, kann aber nur mit grossen Verlusten umkrystallisiert werden; silberglänzende Blättchen vom Smp. 242 bis 243°.

6,530 mg Subst. gaben 0,227 cm<sup>3</sup> N<sub>2</sub> (18°, 749 mm)  
 $C_{14}H_{22}O_7NCl$  Ber. N 3,98 Gef. N 4,02%

### Betain-ester-bromhydrat von Base III (Formel III).

Lässt man Base III in Bromessigester gelöst 14 Tage lang stehen, so krystallisiert nichts aus, auch nicht auf Zusatz von Äther. Deswegen wird mit Wasser versetzt und die 6mal mit Äther extrahierte wässrige Lösung mit Norit-Kohle geschüttelt. Die farblose Lösung wird im Vakuum zuletzt über Phosphorpentoxyd eingetrocknet. Das Salz ist so hygroskopisch, dass es nicht umkrystallisiert werden konnte, die wässrige Lösung besitzt ein  $p_H$  von 5. Es gelang auch nicht, ein krystallisierendes Perchlorat darzustellen.

Polarisation in Wasser:

$$p = 5 \quad d_4^{20} = 1,0112 \quad \alpha_D^{20} = -0,27^\circ \text{ (0,5 dm-Rohr)} \quad [\alpha]_D = -10,7^\circ \quad M_D = -38,6^\circ$$

### Trimethylammoniumhydroxyde der Basen I und VII (Formel IX und X).

Das Jodmethylat der Base I (siehe die vorhergehende Abhandlung) setzt sich in wässriger Lösung mit Silberoxyd um. Beim Eindunsten wird ein stark gefärbtes Produkt erhalten, das auch mit Norit-Kohle nicht farblos gewonnen werden konnte. Die Lösung reagiert stark alkalisch und zieht aus der Luft Kohlendioxyd an. Das  $p_H$  einer 0,01-n. Lösung wurde mit der Antimonelektrode zu 9,8 bestimmt, doch dürfte der wirkliche  $p_H$ -Wert bei ungefähr 11 liegen.

Polarisation in Wasser:

$$p = 5 \quad \alpha_D^{20} = -0,78^\circ \text{ (0,5 dm-Rohr)} \quad [\alpha]_D = -38,8^\circ$$

Das Perchlorat muss sofort umkrystallisiert werden, da es sich beim Stehen rasch zersetzt. Das auf Ton gestrichene Produkt wird aus Alkohol mit Äther ausgefällt, nach 3-maliger Wiederholung dieses Verfahrens erhält man weisse Nadeln vom Smp.  $114^\circ$  (vorherige Sinterung bei  $108^\circ$ ).

3,201 mg Subst. gaben 5,600 mg  $CO_2$  und 2,150 mg  $H_2O$

$C_{13}H_{24}O_6NCl$  Ber. C 47,89 H 7,43%

Gef. „ 47,71 „ 7,51%

Das Jodmethylat der Enol-Base VII konnte mit Silberoxyd bequem umgesetzt werden. Aus der filtrierten Lösung schieden sich über Nacht schöne, bis 2 cm lange säulenförmige Krystalle aus. Zum Umkrystallisieren wurde in Alkohol gelöst und mit Äther gefällt; kleine weisse Nadeln vom Smp.  $168^\circ$ . Im Gegensatz zu der oben beschriebenen Ammoniumbase I ist diese Ammoniumverbindung der Enolbase keine starke Base, zieht kein Kohlendioxyd an und ist ganz beständig. Das  $p_H$  mit der Antimonelektrode für 0,01-n. bestimmt, liegt bei 9,15. Die Analyse ergab, dass keine Wasserabspaltung stattgefunden hatte, es lag also ein normales quaternäres Ammoniumhydroxyd der Enolbase vor. Formel X.

4,588 mg Subst. gaben 11,685 mg  $CO_2$  und 4,345 mg  $H_2O$

$C_{13}H_{23}O_2N$  Ber. C 69,28 H 10,29%

Gef. „ 69,46 „ 10,59%

Das Perchlorat ist schwer löslich, aus Alkohol und Äther umgelöst krystallisiert es in weissen Nadeln vom Smp. 138—139°.

5,804 mg Subst. gaben 0,227 cm<sup>3</sup> N<sub>2</sub> (18°, 750 mm)

C<sub>13</sub>H<sub>22</sub>O<sub>5</sub>NCl Ber. N 4,55 Gef. N 4,53%

Es sei hier noch erwähnt, dass die quaternäre Ammoniumbase aus der Enolbase VII auch mit Dimethylsulfat dargestellt werden kann. Es findet zuerst eine Anlagerung an den Stickstoff statt, nach Weiterbehandlung mit Natronlauge entstand dann unter Abspaltung der CH<sub>3</sub>SO<sub>4</sub>-Restes die Ammoniumverbindung. Aus der stark alkalischen Lösung schied sich der Körper in langen flachen Stäbchen aus. Nach 2-maligem Umkrystallisieren aus Wasser besaßen sie den Smp. 168—169° (siehe oben).

5,143 mg Subst. gaben 0,274 cm<sup>3</sup> N<sub>2</sub> (17,5°, 748 mm)

C<sub>13</sub>H<sub>23</sub>O<sub>2</sub>N Ber. N 6,22 Gef. N 6,16%

### Cholin der Base I (Formel XI).

2 g der Base I erwärmte man über Nacht mit der gleichen Menge Äthylen-chlorhydrin auf dem Wasserbade. Als dann mit absolutem Äther versetzt wurde, wurde das neue Produkt fest, nach dem Auswaschen mit Äther nahm man es in Alkohol auf und versetzte bis zur Trübung mit Äther. Nach einigem Stehen krystallisierte das Cholin-chlorhydrat in schönen weissen, prismatischen Krystallen aus, die nach zweimaliger Reinigung bei 105° schmolzen. Im Gegensatz zu dem Betain-bromhydrat der Base I reagiert die wässrige Lösung dieses Cholins vollständig neutral, p<sub>H</sub> = 7.

6,654 mg Subst. gaben 0,278 cm<sup>3</sup> N<sub>2</sub> (18,5° 736 mm)

C<sub>14</sub>H<sub>26</sub>O<sub>3</sub>NCl Ber. N 4,80 Gef. N 4,74%

Betainbase. Aus der Behandlung des Chlorhydrates mit Silberoxyd in wässriger Lösung erhält man nach dem Schütteln mit Tierkohle und dem Eindunsten im Vakuum eine leicht gelbgefärbte, amorphe Substanz, deren wässrige Lösung stark alkalisch reagiert. Die p<sub>H</sub>-Messung mit der Antimonelektrode ergab einen Wert von 11,2—11,3. Es dürfte also hier das Cholin der Base I vorliegen; leider gelang es nicht, ein krystallisierendes Salz (Perchlorat) davon darzustellen.

Mit der Base I wurden noch weitere Anlagerungsversuche ausgeführt, über die später berichtet werden soll. So z. B. konnte Dibenzoyl-mono-brommethan durch 14-tägiges Stehenlassen mit der Base in ätherischer Lösung angelagert werden. Aus der wässrigen Lösung erhält man eine glasige Masse, die allerdings nicht weiter untersucht wurde, sie ist vielleicht eines der Enol-betaine von Kröhnke. Auch Methylen-campherchlorid scheint sich beim Erwärmen<sup>1)</sup> im geschlossenen Rohr an Base I anzulagern, doch müssen auch diese Versuche noch weiter fortgeführt werden.

Es sei uns gestattet, Fräulein Dr. Margrit Schärer auch an dieser Stelle für die ausgezeichnete Mithilfe bei der Ausführung der optischen Messungen unsern besondern Dank auszusprechen.

<sup>1)</sup> Diese Versuche wurden von Hrn. cand. phil. Franz Haefliger ausgeführt.

## Curriculum vitae.

---

Ich, *Hans Gysin*, wurde am 16. April 1913 in Liestal geboren, als Sohn des Hans Gysin, Stationsvorstand in Gelterkinden, von Liestal und seiner Gattin Louise geb. Eymann.

Ich besuchte die Primarschulen in Liestal und Gelterkinden, die Bezirksschule in Böckten und die Obere Realschule, später das Math. Naturwissenschaftliche Gymnasium in Basel. Im Frühjahr 1932 erhielt ich das Reifezeugnis und immatrikulierte mich an der Universität Basel um Chemie zu studieren. Ich arbeitete zunächst an der anorganischen Abteilung der chemischen Anstalt unter Herrn Prof. Dr. Fr. Fichter, bei dem ich im W. S. 1933/34 den Posten eines Vorlesungsassistenten für „seltene Metalle“ und im S. S. 1934 für „Experimentalchemie“ versah. Nach bestandenem Vorexamen in anorganischer und analytischer Chemie im Juli 1934 arbeitete ich unter Herrn Prof. Dr. H. Rupe; im S. S. 1935 war ich Vorlesungsassistent für „Benzolchemie“. Das organische Vorexamen legte ich im November 1935 ab; zu gleicher Zeit begann ich unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. H. Rupe die vorliegende Arbeit über „optisch aktive Zwitterionen und Enolbetaine aus Carvon“, die im Februar 1938 ihren Abschluss fand. Während meiner ganzen Doktorandenzeit war ich Privatassistent von Herrn Prof. Dr. H. Rupe.

Die Teilexamina in Experimentalphysik (15. II. 1934), Mineralogie (2. V. 1935) und Phys. Chemie (15. I. 1937) bestand ich bei den Herren Professoren Dr. A. Hagenbach, Dr. M. Reinhard, Dr. Fr. Bürcki.

Im Verlaufe meiner Studien besuchte ich Vorlesungen und Praktika folgender Herren Professoren und Dozenten: E. Baer, A. L. Bernoulli, P. Buchner, Fr. Bürcki, S. Edlbacher, H. Erlenmeyer, Fr. Fichter, H. O. L. Fischer, A. Hagenbach, Fr. Leuthardt, Frl. E. Mahler, M. Reinhard, P. Ruggli, H. Rupe, H. Zickendraht.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, allen diesen Herren meinen herzlichen Dank auszusprechen. Mein besonderer Dank gilt meinem hochverehrten Lehrer Prof. Dr. H. Rupe für seine wertvollen Ratschläge und Anregungen und für das mir stets erwiesene Wohlwollen.

---



